

## EXERCICES : VECTEURS ET DROITES

### I. Colinéarité

**Exercice 1.** Dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $A(6;2)$ ,  $B(-2;-3)$  et  $C(17;9)$ .

Que dire des points A, B et C ?

Si le point D a pour coordonnées  $(120;75)$  le quadrilatère BADO est-il un trapèze ?

**Exercice 2.** ABCD est un rectangle.

E est le symétrique de C par rapport à B, F est le symétrique de A par rapport à D, G est le point tel que  $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AB}$ .

1. Faire une figure.
2. En se plaçant dans le repère  $(A; \vec{AB}; \vec{AD})$ , démontrer que G, E et F sont alignés.
3. Soit H le point d'intersection de (EF) et (CD). Exprimer  $\vec{DH}$  en fonction de  $\vec{AB}$ .

**Exercice 3.** ABCD est un tétraèdre. Dans le plan (ABC), le point K est défini par :

$$\vec{AK} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$$

1. Faire une figure puis une deuxième dans le plan (ABC).
2. En choisissant un repère du plan (ABC), démontrer que B, K et C sont alignés.

### II. Décomposition dans une base

**Exercice 4.** On considère ABCD un parallélogramme non aplati.

1. Donner la décomposition des vecteurs  $\vec{CA}$ ,  $\vec{BD}$ ,  $\vec{AO}$  et  $\vec{BC}$  dans la base  $(\vec{CB}; \vec{CD})$ .
2. Exprimer le vecteur  $\vec{CA}$  dans chacune des bases suivantes :

(a)  $(\vec{AB}; \vec{AD})$ .

(b)  $(\vec{OB}; \vec{OC})$ .

(c)  $(\vec{u}; \vec{v})$  avec  $\vec{u} = 2\vec{CB}$  et  $\vec{v} = -0,5\vec{CD}$ .

3. Quelles sont les coordonnées du vecteur  $\vec{w} = \vec{CA} + 2\vec{BD}$  dans la base  $(\vec{CB}; \vec{CD})$ .

**Exercice 5.** Soit ABC un triangle. Le point I est tel que  $\vec{BI} = \frac{2}{5}\vec{BA}$ , le point J est l'image de C par la translation de vecteur  $\vec{AC}$ , et le point K est défini par la relation vectorielle :

$$-3\vec{AK} + 3\vec{BK} + 10\vec{CK} = \vec{0}$$

1. Montrer que les points I, J et K sont alignés.
2. Préciser la position de K sur (IJ).

**Exercice 6.** A, B et C sont trois points non alignés. Les points D, E et F sont définis par :

$$\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

Le but de l'exercice est de démontrer par deux méthodes que les points D, E et F sont alignés puis de comparer ces deux méthodes.

Faire une figure.

**PARTIE A.**

**méthode 1**

1. Justifier que  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$  est un repère du plan.
2. Déterminer les coordonnées des points D, E et F dans ce repère.
3. En déduire celles des vecteurs  $\overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{DF}$  et démontrer que D, E et F sont alignés.

**PARTIE B.**

**méthode 2**

1. Ecrire chacun des vecteurs  $\overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{DF}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Montrer que les vecteurs  $\overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{DF}$  sont colinéaires. Conclure.

**PARTIE C.**

**Comparaison des deux méthodes**


1. Comparer les relations vectorielles trouvées dans la partie B avec les coordonnées de  $\overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{DF}$  trouvées dans la partie A. Commenter.

**Exercice 7.** Soit ABC un triangle et  $a$  un réel.

On considère les points P, Q et R définis par :

$$\overrightarrow{AP} = a\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{CQ} = a\overrightarrow{CA} \quad \overrightarrow{CR} = a\overrightarrow{CB}$$

La figure ci-contre correspond au cas où  $a = \frac{1}{2}$



Existe-t-il des valeurs de  $a$  pour lesquelles les points P, Q et R sont alignés ?

**Exercice 8.**

**Démonstration de cours**

On considère trois points du plan A, B et C non alignés.

Soit M un point du plan.

1. **Existence**

La parallèle à (AC) passant par M coupe (AB) en P et la parallèle à (AB) passant par M coupe (AC) en Q.

- (a) Réaliser une figure.
- (b) Montrer qu'il existe un réel  $x$  tel que  $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB}$  et un réel  $y$  tel que  $\overrightarrow{AQ} = y\overrightarrow{AC}$ .
- (c) Quelle est la nature du quadrilatère APMQ ? Justifier.

(d) En déduire l'expression de  $\vec{AM}$  en fonction de  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$ .

## 2. Unicité

Supposons maintenant qu'il existe deux couples  $(x; y)$  et  $(x'; y')$  tels que :

$$\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC} = x'\vec{AB} + y'\vec{AC}$$

(a) Démontrer que  $(x - x')\vec{AB} = (y' - y)\vec{AC}$ .

(b) En déduire que  $x = x'$  et que  $y = y'$ .

(c) Conclure.

**Exercice 9.** Soit un triangle RST et K le milieu de [RS].

1. Construire les points H et L tels que :

$$\vec{TH} = -3\vec{TR} \quad \text{et} \quad \vec{SL} = -2\vec{ST}$$

2. Montrer que  $\vec{TR} + \vec{TS} = 2\vec{TK}$ .

3. Décomposer le vecteur  $\vec{HL}$  sur  $\vec{TR}$  et  $\vec{TS}$

4. En déduire que (HL) et (TK) sont parallèles.

**Exercice 10.** Construire un triangle ABC, puis les points D, E et F tels que  $\vec{AD} = \frac{1}{2}\vec{AC}$  et  $\vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{AB}$  et  $\vec{BF} = 2\vec{BC}$ .  
Le but de cet exercice est de démontrer par deux méthodes différentes que D, E et F sont alignés.

1. (a) Décomposer  $\vec{DE}$  dans la base  $(\vec{AB}; \vec{AC})$ .

(b) Décomposer  $\vec{DF}$  dans la base  $(\vec{AB}; \vec{AC})$ .

(c) Démontrer que D, E et F sont alignés.

2. La parallèle à (DE) passant par C coupe [AB] en un point I.

(a) Démontrer que E est le milieu de [AI].

(b) En déduire que I est le milieu de [EB].

(c) Démontrer alors que la droite (CI) est parallèle à la droite (FD). Conclure.

**Exercice 11.** ABCD est un tétraèdre. I est le milieu de [AB], J celui de [BD] et K celui de [JC]. E est le point du segment [AE] tel que  $AE = \frac{2}{3}AJ$  et F est le point du segment [BC] tel que  $BF = \frac{2}{3}BC$ .

1. Faire une figure.

2. On se place dans le plan (ABD). Faire une figure (dans le plan (ABD)) puis démontrer que I, E et D sont alignés.

3. On se place dans le plan (BCD). Démontrer que F, K et D sont alignés.

4. (a) Que peut-on dire des droites (IE) et (FK) ?

(b) En déduire que I, E, F et K sont coplanaires.

## III. Vecteurs directeurs et droites

**Exercice 12.** On considère un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par le point  $A(2; -1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(-1; 2)$ .

**Exercice 13.** On considère un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par les points  $A(15; -10)$  et  $B(-25; 30)$ .

**Exercice 14.** On considère un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan.

1. Donner une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par le point  $A(5; -1)$  et parallèle à la droite  $d_1$  dont une équation cartésienne est  $2x - 7y = 2$ .
2. La droite  $d$  est-elle parallèle à la droite  $d_2$  dont l'équation réduite  $y = -\frac{2}{7}x + 3$ .

**Exercice 15.**

1. Tracer la droite  $(AB)$  avec  $A(2; -3)$  et  $B(4; -5)$ .
2. Donner trois vecteurs directeurs de la droite  $(AB)$ .

**Exercice 16.** Quel est le coefficient directeur d'une droite de vecteur directeur  $\vec{u}$  avec :

1.  $\vec{u}(1; -3)$
2.  $\vec{u}(-2; 4)$
3.  $\vec{u}(5; -2)$
4.  $\vec{u}\left(\frac{1}{4}; 2\right)$

**Exercice 17.** Soit  $d$  la droite d'équation  $2x - 3y = -7$ .

1. Le point  $A(-2; 1)$  appartient-il à  $d$ ?
2. Même question avec  $B\left(\frac{1}{3}; \frac{5}{2}\right)$  et  $C\left(3; \frac{13}{3}\right)$ .
3. Trouver l'ordonnée du point  $E$  de  $d$  d'abscisse  $-\frac{2}{7}$ .
4. Trouver l'abscisse du point  $F$  de  $d$  d'ordonnée  $\frac{1}{5}$ .

**Exercice 18.** Placer les points  $A(-2; 4)$ ,  $B(2; 2)$ ,  $C(-5; 0)$  et le point  $D$  tel que  $\vec{CD} = 2\vec{AB}$ .

1. (a) Quelle est la nature du quadrilatère  $ABDC$  ?  
(b) Déterminer les coordonnées de  $D$ .
2. (a) Soit  $d : 6x + y = 14$ .  
Vérifier que  $B$  et  $D$  appartiennent à  $d$ .  
(b) Trouver une équation cartésienne de la droite  $(AC)$ .  
(c) Prouver que  $(BD)$  et  $(AC)$  sont sécantes.  
(d) Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection  $E$ .
3. (a) Calculer les coordonnées de  $K$  milieu de  $[AB]$  et de  $L$  milieu de  $[CD]$ .  
(b) Démontrer que les points  $E$ ,  $K$  et  $L$  sont alignés.

**Exercice 19.** Soit  $m$  un réel et  $d$  la droite d'équation

$$x + my + 3 = 0$$

Peut-on trouver  $m$  tel que :

1.  $\vec{u}(3; 2)$  soit un vecteur directeur de  $d$ .
2.  $A(-2; 3)$  appartienne à  $d$ .
3.  $d$  soit parallèle à la droite d'équation  $3x - y = 0$ .
4.  $d$  soit parallèle à l'axe des abscisses.
5.  $d$  soit parallèle à l'axe des ordonnées.
6.  $d$  passe par l'origine du repère.
7.  $d$  passe par le point  $J(0; 1)$ .

**Exercice 20.** Dans un repère du plan  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $A(3; 4)$ ,  $B(1; -1)$  et  $C(6; -2)$ .

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$ .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  passant par le milieu  $I$  de  $[AC]$  et parallèle à  $(AB)$ .
3.  $\Delta$  est la droite d'équation  $-16x + y = -98$ 
  - (a) Prouver que  $\Delta$  et  $(AB)$  sont sécantes en  $D$  de coordonnées à déterminer.
  - (b) Montrer que le milieu  $J$  de  $[DC]$  est un point de  $d$  de deux manières différentes.

**Exercice 21.** Soit  $ABC$  un triangle non aplati.

Pour tout réel  $t$ , on considère le point  $M_t$  défini par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{BM_t} = t\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$$

1. Construire sur la même figure  $M_0$ ,  $M_1$  et  $M_{-1}$ .
2. Déterminer et construire le lieu géométrique des points  $M_t$  lorsque  $t$  décrit  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 22.** Soit  $ABCD$  un trapèze tel que  $(AB)$  soit parallèle à  $(CD)$ . Soit  $M$  le point d'intersection des droites  $(AD)$  et  $(BC)$ . Soit  $I$  le milieu du côté  $[AB]$  et  $J$  celui du côté  $[CD]$ . On nomme  $K$  le point d'intersection des diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$ . On veut démontrer que  $M$ ,  $I$ ,  $J$  et  $K$  sont alignés.

1. Justifier que  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$  est un repère.
2. Donner les coordonnées de  $A$ ,  $B$ ,  $D$  et  $I$  dans ce repère.
3. On nomme  $a$  l'abscisse du point  $C$  dans le repère  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ . Déterminer, en fonction de  $a$ , les coordonnées de  $C$  et de  $J$ .
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(BC)$  et en déduire les coordonnées de  $M$ .
5. Montrer que les points  $M$ ,  $I$  et  $J$  sont alignés.
6. Déterminer une équation cartésienne de  $(BD)$  et de  $(AC)$ . En déduire les coordonnées de  $K$ .
7. Conclure.

## IV. Un exemple de devoir

**Exercice 23.** ABC est un triangle quelconque. Les points N et P sont tels que  $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$  et  $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$ .

- Faire un schéma de la situation.  
*On veut montrer de deux manières différentes que les points A, P et N sont alignés.*
- Solution analytique dans le repère  $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$  :**
  - Expliquer pourquoi  $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$  est un repère du plan.
  - Quelles sont les coordonnées des points A, B, C et N dans ce repère ?
  - Calculer les coordonnées du point P.
  - Montrer que les points A, P et N sont alignés.
- Solution vectorielle (sans repère, on utilisera donc pas les résultats de la question 2.) :**
  - Ecrire le vecteur  $\overrightarrow{AP}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
  - En déduire que les vecteurs  $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AP}$ , où  $k$  est un réel à déterminer.
  - Expliquer alors pourquoi les points A, P et N sont alignés.

**Exercice 24.** Le plan est muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . On considère les points  $A(1; 2)$ ,  $B(-1; 3)$  et  $C(4; -1)$ .

- Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
  - Donner un vecteur directeur de la droite (AB) d'ordonnée 1.
  - Trouver le point D de la droite (AB) d'ordonnée 1.
- Donner une équation cartésienne de la droite  $(d)$  de vecteur directeur  $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$  et passant par le point A.
  - Le point  $E\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$  appartient-il à la droite  $d$  ?
- Calculer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{BE}$ .
  - Que peut-on dire des droites (BE) et (AC) ? Justifier.
- Montrer qu'une équation cartésienne de la droite (CE) est  $5x + 7y - 13 = 0$ .
  - Calculer les coordonnées du point d'intersection F des droites (AB) et (CE).

**Exercice 25.** Dans un repère,  $d$  est la droite d'équation

$$ax + by + c = 0 \quad \text{avec } (a; b) \neq (0; 0)$$

Expliquer le rôle de l'algorithme ci-contre, dont les variables sont les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$ .



### Algorithme 1 : Droites

**Données:**  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des nombres réels

Saisir  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

**Si** ( $a \neq 0$ ) **Alors**

    Afficher « Point A  $\left(-\frac{c}{a}; 0\right)$  » ...

**Sinon**

    Afficher « Pas de point d'intersection. »

**Fin Si**